

【レジメン一覧（一部）】

2026.08

<乳がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
ddAC	14日	ドキシソルピシン	60mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術前・術後補助療法として4クール				
ddEC	14日	エビルピシン	90mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術前・術後補助療法として4クール				
ddPTX	14日	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	day1	軽度
備考：術前・術後補助療法として4クール						
DTX(75)	21日	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	軽度
備考：術前・術後補助療法として4クール						
TC(術後補助)	21日	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術後補助療法として4クール				
EC(EPI90/CPA600)	21日	エビルピシン	90mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術前・術後補助療法として4クール				
EC(術後補助)	21日	エビルピシン	75mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術前・術後補助療法として4クール				
EC(再発)	21日	エビルピシン	60mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
Weeklyパクリタキセル	21日	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
		備考：術前・術後補助療法として実施する場合は4クール				
Weeklyパクリタキセル+トラスツズマブ 【術後補助】	21日	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
		トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	点滴静注	day1,8,15	
		備考：術後補助療法として4クール				
Weeklyパクリタキセル+アバスチン	28日	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
		ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,15	
ハラヴェン	21日	エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	day1,8	軽度
ゲムシタピン	21日	ゲムシタピン	1250mg/m ²	点滴静注	day1,8	軽度
Atezolizumab + nab-PTX	21日	アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注	day1,15	軽度
		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
ベルツズマブ+トラスツズマブ+PTX	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	軽度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
フェスゴ_PER+HER+wPTX	21日	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニターゼ アルファ	初回 IN、2回目以降 MA	皮下注	day1	軽度
		パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	軽度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術前・術後補助療法として実施する場合は4クール				
フェスゴ_PER+HER+DOC	21日	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニターゼ アルファ	初回 IN、2回目以降 MA	皮下注	day1	軽度
		ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：術前・術後補助療法として実施する場合は4クール				
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ERI	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	軽度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	day1,8	
フェスゴ_PER+HER+ERI	21日	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニターゼ アルファ	初回 IN、2回目以降 MA	皮下注	day1	軽度
		エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	day1,8	

ベルツズマブ+トラスツズマブ	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	最小度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
	備考：補助療法の維持療法					
フェスゴ_PER+HER	21日	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニターゼ アルファ	初回 IN、2回目以降 MA	皮下注	day1	最小度
Triweeklyトラスツズマブ	21日	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	最小度
備考：補助療法の維持療法						
TCH+PER	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	高度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	
		カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	day1	
	備考：術前治療は6クール					
Pembro(200)+GEM+CBDCA	21日	ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	中等度
		ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8	
		カルボプラチン	AUC 2	点滴静注	day1,8	
CBDCA【AUC5】+PTX+Pembro (TN乳がん術前)	21日	ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	高度
		バクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
		カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	day1	
Weekly CBDCA【AUC1.5】+PTX+Pembro (TN乳がん術前)	21日	ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	中等度
		バクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
		カルボプラチン	AUC 1.5	点滴静注	day1,8,15	
AC+Pembro(TN乳がん術前)	21日	ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	高度
		ドキソルビシン	60mg/m ²	点滴静注	day1	
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
EC+Pembro(TN乳がん術前)	21日	ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	高度
		エビルビシン	90mg/m ²	点滴静注	day1	
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
ベムブロリズマブ単独(TN乳がん術後)	21日	ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	最小度
カドサイラ	21日	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	day1	軽度
エンハーツ	21日	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注	day1	高度
トロデルビ	21日	サシツズマブ ゴビテカン	10mg/kg	点滴静注	day1,8	高度
ダトロウェイ	21日	ダトボタマブ デルクステカン	6mg/kg	点滴静注	day1	中等度

<胃がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
トラスツズマブ+SOX	21日	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		ﾎｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ﾌﾗﾗｼﾙ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
SOX	21日	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		ﾎｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ﾌﾗﾗｼﾙ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
SOX(130)	21日	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		ﾎｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ﾌﾗﾗｼﾙ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
XELOX	21日	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		カベシタピン	2000mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
FOLFOX	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
RAM+PTX	28日	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1,15	軽度
		パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
ニボルマブ(240)	14日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度
CPT-11	28日	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	中等度
パクリタキセル	28日	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
Nivo+SOX	21日	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		ﾎｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ﾌﾗﾗｼﾙ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
エンハーツ	21日	トラスツズマブ　デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	day1	高度
Tmab+XELOX	21日	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		カベシタピン	2000mg/m ²	経口	day1-14	
		備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
Pembro+Tmab+XELOX	21日	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	中等度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		カベシタピン	2000mg/m ²	経口	day1-14	
		備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
Pembro+Tmab+SOX	21日	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	中等度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		ﾎｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ﾌﾗﾗｼﾙ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				

<大腸がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
mFOLFOX6	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
mFOLFOX6 + パニツムマブ	14日	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
mFOLFOX6 + ベバシズマブ	14日	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
FOLFIRI	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
FOLFIRI + パニツムマブ	14日	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
FOLFIRI + ベバシズマブ	14日	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
FOLFIRI + RAM	14日	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
FOLFIRI + AFL	14日	アフリベルセプトベータ	4mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
XELOX	21日	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		カベシタピン	2000mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
XELOX + BV	21日	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		カベシタピン	2000mg/m ² /day	経口	day1-14	
備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服						
SOX + ベバシズマブ	21日	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		チカフル・ギマシル・チタシル(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
IRIS + ベバシズマブ	21日	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		チカフル・ギマシル・チタシル(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				

BEV + TFTD	28日	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15	中等度
		トリフルジン・フルニル(TFTD)	70mg/m ² /day	経口	day1-5,8-12	
	備考：TFTDは1回35mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday6朝までとday8夕からday13朝まで内服					
パニツムマブ	14日	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	最小度
FOLFOXIRI + BEV	14日	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	高度
		イリノテカン	165mg/m ²	点滴静注	day1	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	3200mg/m ²	持続静注(48時間)	day1	
BRAF triplet	28日	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22	軽度
		エンコラフェニブ	300mg/body/day	経口	連日	
		ピニメチニブ	90mg/body/day	経口	連日	
	備考：エンコラフェニブは1回300mgを1日1回、ピニメチニブは1回45mgを1日2回内服					
NIVO+IPI	21日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度
		イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	day1	
	備考：MSI-High（高頻度マイクロサテライト不安定性）対象、最大4クール					
ニボルマブ(240)	14日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度
備考：MSI-High（高頻度マイクロサテライト不安定性）対象、NIVO+IPI後の維持療法						
ニボルマブ(480)	28日	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1	最小度
備考：MSI-High（高頻度マイクロサテライト不安定性）対象、NIVO+IPI後の維持療法						
PER+HER	21日	ペルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	最小度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
XELIRI+BV	21日	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		カベシタピン	1600mg/m ² /day	経口	day1-14	
	備考：カベシタピンは1回800mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服					

<肝細胞がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
デセントリク+アバスチン	21日	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	最小度
		ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
RAM	14日	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	最小度
durvalumab単剤	28日	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	最小度
		備考：Tremelimumab+Durvalumab後の維持療法				
NIVO+IPI	21日	ニボルマブ	80mg/body	点滴静注	day1	最小度
		イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注	day1	
NIVO(240)	14日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度
		備考：NIVO+IPI後の維持療法				
NIVO(480)	28日	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1	最小度
		備考：NIVO+IPI後の維持療法				

<膵がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
FOLFIRINOX	14日	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
GEM + nab-PTX	28日	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	中等度
		ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
nal-IRI + 5-FU/LV	14日	イリノテカン(リボソーム製剤)	70mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
GEM	28日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
GEM+S-1 (G:d1,8、S:60mg/m ²)	21日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8	中等度
		ナガフル・ギメシル・オテシル(S-1)	60mg/m ² /day	経口	day1-14	
GEM+S-1 (G:d1,15、S:80mg/m ²)	28日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,15	中等度
		ナガフル・ギメシル・オテシル(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	

<胆道がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
GEM	28日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
GEM+S-1 (G:d1,8、S:60mg/m ²)	21日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8	中等度
		ナ ^o フル・ギ ^o メシル・オテシル(S-1)	60mg/m ² /day	経口	day1-14	
GEM+S-1 (G:d1,15、S:80mg/m ²)	28日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,15	中等度
		ナ ^o フル・ギ ^o メシル・オテシル(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
durvalumab+GEM+CDDP	21日	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	中等度
		ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8	
		シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	day1,8	
durvalumab単剤	28日	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	最小度
		備考：durvalumab+GEM+CDDP後の維持療法				

<肺がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
キイトルーダ(200)	21日	ベムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	最小度
キイトルーダ(400)	42日	ベムプロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1	最小度
Atezolizumab + Bev	21日	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	最小度
		ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
		備考：Atezolizumab + CBDCA + PTX + Bev後の維持療法				
オシメルチニブ+PEM	21日	オシメルチニブ	80mg/日	経口	day1-21	軽度
		ベメトレキシド	500mg/m ²	点滴静注	day1	
		備考：オシメルチニブ+CDDP+PEM後の維持療法				

<食道がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
mFOLFOX6	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
ドセタキセル	21日	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	day1	軽度
ニボルマブ(240)	14日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度
ニボルマブ(480)	28日	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	day1	最小度
ペムブロリズマブ(200)	21日	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	最小度
ペムブロリズマブ(400)	42日	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1	最小度
NIVO(2w)+IPI	42日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1,15,29	最小度
		イビリムマブ	1mg/kg	点滴静注	day1	
NIVO(3w)+IPI	42日	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	day1,22	最小度
		イビリムマブ	1mg/kg	点滴静注	day1	
Weekly PTX	49日	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36	軽度