

<乳がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
ddAC	14日	ドキシソビシン	60mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
備考：術前・術後補助療法として4クール						
ddPTX	14日	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	day1	軽度
備考：術前・術後補助療法として4クール						
DTX(75)	21日	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	軽度
備考：術前・術後補助療法として4クール						
TC(術後補助)	21日	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
備考：術後補助療法として4クール						
EC(EPI90/CPA600)	21日	エビルピシン	90mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
備考：術前・術後補助療法として4クール						
EC(術後補助)	21日	エビルピシン	75mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
備考：術前・術後補助療法として4クール						
EC(再発)	21日	エビルピシン	60mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	
Weeklyパクリタキセル+アバスチン	28日	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度
		ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	day1,15	
		エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	day1,8	
ハラヴェン	21日	エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	day1,8	軽度
シエムザール	21日	ゲムシタピン	1250mg/m ²	点滴静注	day1,8	軽度
Atezolizumab + nab-PTX	21日	アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注	day1,15	軽度
		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	軽度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	
備考：術前・術後補助療法として実施する場合は4クール						
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ERI	21日	ベルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	点滴静注	day1	軽度
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
		エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	day1,8	
ベルツズマブ+トラスツズマブ	21日	ベルツズマブ	420mg/body	点滴静注	day1	最小度
		トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	
備考：補助療法の維持療法						
Triweeklyトラスツズマブ	21日	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	最小度
備考：補助療法の維持療法						
カドサイラ	21日	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	day1	軽度

<胃がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
トラスツズマブ+SOX	21日	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		ソラフェニブ・ドセタキセル・セキナズマブ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
SOX	21日	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		ソラフェニブ・ドセタキセル・セキナズマブ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
SOX(130)	21日	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		ソラフェニブ・ドセタキセル・セキナズマブ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
XELOX	21日	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		カベシタピン	2000mg/m ² /day	経口	day1-14	
		備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服				
FOLFOX	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
RAM+PTX	28日	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1,15	軽度
		パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
ニボルマブ(240)	14日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度
CPT-11	28日	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	中等度
パクリタキセル	28日	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度

<大腸がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
mFOLFOX6	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
mFOLFOX6+パニツムマブ	14日	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
mFOLFOX6+ベバシズマブ	14日	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
FOLFIRI	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
FOLFIRI+パニツムマブ	14日	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
FOLFIRI+ベバシズマブ	14日	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
FOLFIRI+RAM	14日	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
FOLFIRI+AFL	14日	アフリベルセプトベータ	4mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
XELOX	21日	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		カベシタピン	2000mg/m ² /day	経口	day1-14	
備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服						
XELOX+BV	21日	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		カベシタピン	2000mg/m ² /day	経口	day1-14	
備考：カベシタピンは1回1000mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服						
SOX+ベバシズマブ	21日	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
		サキニチニブ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服						
IRIS+ベバシズマブ	21日	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	中等度
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
		サキニチニブ(S-1)	80mg/m ² /day	経口	day1-14	
備考：S-1は1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday15朝まで内服						
BEV+TFTD	28日	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15	中等度
		トリフルフル(TFTD)	70mg/m ² /day	経口	day1-5,8-12	
備考：TFTDは1回35mg/m ² を1日2回朝夕食後、day1夕からday6朝までとday8夕からday13朝まで内服						
パニツムマブ	14日	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	最小度
FOLFOXIRI+BEV	14日	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	高度
		イリノテカン	165mg/m ²	点滴静注	day1	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
BRAF triplet	28日	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22	軽度
		エンコラフェニブ	300mg/body/day	経口	連日	
		ピニメチニブ	90mg/body/day	経口	連日	
		備考：エンコラフェニブは1回300mgを1日1回、ピニメチニブは1回45mgを1日2回内服				

<肝細胞がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
デセントリク+アバスチン	21日	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	最小度
		ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
RAM	14日	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	最小度

<膵がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
FOLFIRINOX	14日	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	高度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
GEM+nab-PTX	28日	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	中等度
		ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
nal-IRI+5-FU/LV	14日	イリノテカン(リボソーム製剤)	70mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
ジェムザール	28日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度

<胆道がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
ジェムザール	28日	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	軽度

<肺がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
キイトルーダ(200)	21日	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	最小度
キイトルーダ(400)	42日	ペムプロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1	最小度
Atezolizumab+CBDDCA+PTX+Bev	21日	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	高度
		バクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	day1	
		カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	day1	
		ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
備考：4～6コース施行後、Atezolizumab+Bevの維持療法に移行						
Atezolizumab+Bev	21日	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	最小度
		ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	

<食道がん>

レジメン名	1クール日数	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	催吐リスク
mFOLFOX6	14日	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	中等度
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注(46時間)	day1	
ドセタキセル	21日	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	day1	軽度
ニボルマブ(240)	14日	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	最小度